

治療皮膚表淺性黴菌感染 • 足癬 • 股癬 • 汗斑

安膚適[®]乳膏
FULTRIX[®] Cream 10mg (Terbinafine)

衛署藥製字第048544 號
醫師藥師藥劑生指示藥品

1. 成分
- 1.1 有效成分及含量
- Each g contains:
- Terbinafine Hydrochloride.....10mg
- 1.2 其他成分(賦形劑)
- Lanocera, Glyceryl Monostearate, Cetyl Alcohol, Polyethylene Glycol Monostearate, Isopropyl Myristate, Methylparaben, Propylparaben, Propylene Glycol, Purified Water, Sodium Citrate, Menthol.
2. 用途(適應症)
- 治療皮膚表淺性黴菌感染，如足癬(香港腳)、股癬、汗斑。
3. 使用上注意事項
- 3.1 有下列情形者，請勿使用
- 3.1.1 曾因本藥成分引起過敏的人。
- 3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治
- 3.2.1 有深部皮膚組織感染。
- 3.2.2 3歲以下。
- 3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生
- 3.3.1 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 3.3.2 正在接受醫師治療。
- 3.3.3 患部在臉上。
- 3.3.4 患部化膿。
- 3.4 其他使用上注意事項
- 3.4.1 為防兒童誤食請妥善保管。
- 3.4.2 避免陽光直射。
- 3.4.3 勿超過建議使用量或使用次數。
- 3.4.4 本劑限於外用不得內用，亦不得用於眼睛四周或黏膜（如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等），濕疹、浸潤、潰爛、龜裂或嚴重外傷的患部。
- 3.4.5 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
- 3.4.6 本藥勿使用於有損傷的皮膚及大面積之體表(以使用者的兩手掌面積為參考)。
- 3.4.7 一般黴菌感染療程至少為 2 週，視感染的程度、部位而定。使用本藥需完成全部療程。
- 3.4.8 使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。
- 3.4.9 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
- 3.4.10 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛。請立刻以水或溫水沖洗，並立刻前往眼科就醫。

4. 用法用量

部 位	用法用量
患 部	一天使用1到2次，使用前需將患部清理乾淨和乾燥，將Terbinafine乳膏少量塗抹於患部，並均勻摩擦於患部。如有破皮感染現象(乳腺下、指尖、臀間、腹股溝間)，可在塗抹Terbinafine乳膏後覆蓋上紗布(尤其是夜間)。

5. 警語

5.1 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
皮 膚	局部皮膚刺激及灼熱感、過敏性皮膚炎：如紅、腫、水泡、脫皮、搔癢等。

5.2 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

- 5.2.1 若有上述外之其他不適情況產生。
- 5.2.2 自覺狀況沒有改善或更惡化。
- 5.2.3 一般黴菌治療7天症狀會改善，股癬和體癬為2週，足癬為4週，如經過前述治療時間，症狀若沒有改善，則應停藥立即就醫。如即使若症狀改善停藥後，病情復發亦應立即就醫。

6. 包裝

1000公克以下/塑膠瓶裝、鋁管裝。

7. 儲存方式

25°C以下。

8. 類別

醫師藥師藥劑生指示藥品

9. 性狀

Terbinafine是allylamine的衍生物，具有廣效抗黴菌作用。在低濃度時對皮膚菌(Dermatophyte)、黴(mould)及某些同質二形性黴菌(Dimorphic Fungi)具有殺黴菌作用。對酵母菌(Yeast)的作用，則依不同的種屬，而有殺黴菌(Fungicidal)或抑制黴菌作用(Fungistatic)。Terbinafine可干擾黴菌合成麥角硬脂醇(Ergosterol)的先期步驟，導致麥角硬脂醇不足，且因細胞內積聚過多的Squalene引起黴菌死亡。Terbinafine的作用機轉是抑制黴菌細胞膜上的Squalene epoxidase，此酵素的作用與細胞色素P450系統(Cytochrome P450 system)無關，且Terbinafine並不會影響荷爾蒙或其他藥物的代謝。

10. 藥物動力學

外用僅低於5%的劑量被吸收，全身性的吸收非常輕微。

製造廠

成大藥品股份有限公司
台南市麻豆區南勢里關帝廟80號
藥商

新加坡商美納里尼醫藥有限公司台灣分公司
台北市中山區民生東路三段2號9樓之2